



Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020




V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014.

A 2013. év vizsgálatának általános eredményei

Pádár Kata
Nielsen



Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020



- **Összesen 725 helyszínen**
 - o 2010: 144
 - o 2011: 191
 - o 2012: 193
 - o **2013: 197**
- **2 266 337 átfogó vizsgálat történt**
 - o 2010: 423 885
 - o 2011: 549 200
 - o 2012: 624 078
 - o **2013: 669 174**
- **194 549 látogató vett részt az életmód tanácsadásban**
 - o 2010: 39 568
 - o 2011: 44 932
 - o 2012: 48 464
 - o **2013: 61 585**

- **Prevencióra fordított órák száma: 6 711** (ebből több mint 1 900 óra 2013-ban)
- **Összesen 85 545 fő vett részt az átfogó vizsgálatokon** – ebből 20 278 fő szűrési eredményei kerültek feldolgozásra



A szűrésben részt vevők demográfiai összetétele






A szűrésben résztvevők nemek szerinti megoszlása




A szűrőprogramban részt vettek száma 2010-2013-ban:

Férfiak: **32 599 fő**


Nők: **41 669 fő**



A szűrésben résztvevők életkori megoszlása



A szűrésben résztvevők regionális megoszlása



Szűrésben résztvevők (2010-2013) / Országos eloszlás





Bács-Kiskun	3,26%
Baranya	0,64%
Békés	2,19%
Borsod-Abaúj-Zemplén	4,47%
Budapest	25,98%
Csongrád	1,85%
Fejér	3,89%
Győr-Moson-Sopron	4,01%
Hajdú-Bihar	4,41%
Heves	7,34%
Jász-Nagykun-Szolnok	3,65%
Komárom-Esztergom	3,94%
Nógrád	1,72%
Pest	15,57%
Somogy	1,44%
Szabolcs-Szatmár-Bereg	4,30%
Tolna	0,55%
Vas	3,84%
Veszprém	5,56%
Zala	1,39%

Bázis: a szűrőprogramban résztvevők, 2010-2013; összesen 74 268 fő





Életmód kérdések






A szűrővizsgálaton részt vettek valamivel több, mint ötöde említette, hogy szenved magas vérnyomásos megbetegedése van és közel ugyanilyen arányban fordulnak elő asztmás / allergiás megbetegedések.

A nők körében valamivel gyakoribb a szembetegség, míg a férfiak körében a hallásveszteség.


Bázis: a szűrésben résztvevők 2010-2013






A szűrésben résztvevők családjában legnagyobb arányban – a válaszadók elmondása alapján – magas vérnyomásos megbetegedés fordul elő, míg daganatos megbetegedés a válaszadók 39 százalékának családjában van jelen.

Bázis: a szűrésben résztvevők 2010-2013-ban






Saját bevallásuk szerint a válaszadók 63 százaléka évente megjelenik a háziorvosnál és 50 százalékuk laborvizsgálaton is részt vesz évente. Kisebb, ugyanakkor növekvő azok aránya, akik átfogó szűrővizsgálaton is megjelennek, legalább évi rendszerességgel.





A programban résztvevők 24 százaléka (saját bevallás alapján) dohányzik. A válaszadó dohányosok 27 százaléka gondolt már arra, hogy felhagy ezzel a szenvedéllyel.

Bázis: a szűrésben résztvevők 2010-2013-ban






A programban résztvevők 89 százaléka gondolja úgy, hogy a túlzott só fogyasztás betegséget okozhat.

**A TÚLZOTT SÓBEVITEL
MAGAS VÉRYOMÁST,
SZÍVINFARKTUST ÉS
AGYVÉRZEST OKOZHAT!**




Bázis: a szűrésben résztvevők 2010-2013-ban






A programban résztvevők kétharmada fogyaszt naponta zöldséget és/vagy gyümölcsöt. A nemek közötti különbségek figyelemreméltóak: míg a nők 70 százaléka fogyaszt napi rendszerességgel zöldséget / gyümölcsöt, addig a férfiaknak csak 59 százaléka. *(Saját bevallás)*

Bázis: a szűrésben résztvevők 2010-2013-ban





A rendszeresen sportolók aránya 46% a szűrésben részt vettek körében – az arány a férfiak esetében magasabb.





Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020



Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020



Pádár Kata

nielsen