

STROKE

NE KÉSLEKEDJ!

Idő=Agy

Minden perc számít!



Gyorsan, gyorsan...

Hívd a 104-et!

A stroke (szélütés, gutaütés) világszerte népbetegség, a második leggyakoribb halálokok, emellett a rokkantság leggyakoribb oka. Magyarországon évente 50-55 ezer akut stroke beteg kórházi kezelésével kell számolnunk.

A Magyar Stroke Társaság (MST) komoly szakmai tevékenységet fejt ki a stroke teljes ellátásában, az akut stroke ellátás, a specifikus diagnosztikai eljárások, az elsődleges és másodlagos stroke megelőzése, a gondozás és a rehabilitáció témakörében.

A stroke ellátás szakmai színvonalának jelentős javulását eredményezte az ideggyógyászati osztályok keretein belül működő Stroke Centrumok létrehozása, melyek a stroke ellátás teljes spektrumát végzik.

Az akut stroke kialakulása esetén nem győzzük hangsúlyozni a gyors cselekvés fontosságát, hiszen a szélütés esetén az egyetlen hatékony terápiás eljárás a tünetek kialakulásától számított három órán belül megkezdett szisztémás vérrög oldó kezelés (thrombolysis).

Ahogy az MST a „stroke – ne késlekedj!” kampányában is hangsúlyozza az akut stroke leggyakoribb tünetei a hirtelen kialakuló féloldali végtaggyengeség és zsibbadás, a száj félrehúzódnása, a beszéd megértésének és kifejezésének zavara, a látászavar és a szédülés.

A stroke ellátás másik igen fontos területe a stroke elsődleges és másodlagos megelőzése. Ennek alapvető feltétele a befolyásolható stroke rizikófaktorok (leggyakrabban a magas vérnyomás, ezen kívül a cukorbetegség, a magas vérszír értékek, a szív és perifériás érbetegségek, a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás...) felismerése és szakszerű kezelése, melyhez elengedhetetlenül fontos a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel, illetve a stroke-on átesett betegek rendszeres gondozása.

A Magyar Stroke Társaság rendszeres figyelem felkeltő rendezvényeivel, szakmai programjaival, valamint a társaság önálló internetes honlapján (www.stroketars.hu) folyamatos tájékoztatást ad az érdeklődők számára.



Ne adjon esélyt a STROKE-nak!

Ha Ön pitvarfibrilláció okozta szabálytalan szívverésben szenved, akkor ötször nagyobb esélye van annak, hogy stroke-ot kapjon.

A PITVARFIBRILLÁCIÓ TÜNETEI:

RENDSZERTELEN
SZÍVVERÉS
SZÉDÜLÉS
LÉGSZOMJ
SZÍVDOBOGÁS-
ÉRZÉS

